

# 【No.88】 ネダプラチン療法

病名 \_\_\_\_\_ ID \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ 氏名 \_\_\_\_\_ ( 才)(男・女)※化学療法承諾書要作成  
 身長 \_\_\_\_\_ cm 体重 \_\_\_\_\_ kg 体表面積 \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup> PS 0・1・2・3・4 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ 科 主治医 \_\_\_\_\_ 治療ライン \_\_\_\_\_ 次治療 \_\_\_\_\_ 服薬指導 依頼する・不要  
 HBs抗原(+)→HBV DNA( )、HBs抗原(-)→HBc抗体( ) HBs抗体( ) 確認医(科長) \_\_\_\_\_

**(アクプラ添付文書より抜粋)**  
**・強い骨髄抑制を有する薬剤であり、頻回に臨床検査を行うなど慎重に投与すること。**  
**※化学療法実施当日の2号紙に、実施の可否について記載すること。(記載確認後ミキシング開始となります。)**

コース	体重	day1	指示	受領
1				
2				
3				
4				
5				
6				

指示内容	点滴時間	計算式 催吐リスク	実施日	day							
				1	2	3	4	5	6	7	
① ○ポート患者 生食20mlシリンジ(穿刺)生食250mlでルート確保 ○末梢患者 生食250mlでルート確保			指示	●							
			受領								
			入力								
			実施								
② 生食100ml + パロノセトロン1V + デキササート6.6mg	30分		指示	●							
			受領								
			入力								
			実施								
③ 生食250ml + アクプラ _____ mg 変更1: _____ mg(変更日: _____) 変更2: _____ mg(変更日: _____) ※終了後①の残液でフラッシュ	60分	30mg/m <sup>2</sup> 中等度 30-90%	指示	●							
			受領								
			入力								
			実施								
④ ST3 500ml × 2回	90分 × 2回 側管		指示	●							
			受領								
			入力								
			実施								
⑤ ヘパリンシリンジロック or 生食シリンジ20ml (ポート患者のみ)			指示	(●)							
			受領								
			入力								
			実施								
			指示								
			受領								
			入力								
			実施								
			指示								
			受領								
			入力								
			実施								
			指示								
			受領								
			入力								
			実施								
<b>週1回 6コース</b>	<b>太枠内は原本に記入せず、カラーコピーして使用すること。</b>										