






【No.109】 Bmab + PTX + CBDCA療法

病名 _____ 外来開始日 _____ 年 _____ 月 _____ 日 治療開始日 _____ 年 _____ 月 _____ 日
 変更日 ① _____ 年 _____ 月 _____ 日 変更日 ② _____ 年 _____ 月 _____ 日
 _____ 科 ID _____ 氏名 _____
 身長 _____ cm 体重 _____ kg 体表面積 _____ m²
 主治医 _____ 指示医 _____ 確認医(科長) _____
 PS 0・1・2・3・4 HBs抗原(+)→HBV DNA(), HBs抗原(-)→HBc抗体() HBs抗体()

指 示 内 容

- ① ○ポート患者
 生食20mlシリンジ(穿刺)・生食250mlでルート確保後、ロック
 ○末梢患者 生食250mlでルート確保後、ロック 
- ② {グラニセトンバッグ100ml or 生食100ml+アロキシ(0.75) 1 A}
 +デキサート _____ mg+ポララミン _____ A
 +{ファモチジン _____ A or プロイメンド150mg} (30min) 
- ※ プロイメンドを使用する場合 使用後「生食50ml全開」を行い次の投与に移ること。
- ③ 生食100ml+アバスチン _____ mg
 (400mg _____ V)(100mg _____ V)
 (90min・60min・30min _____ ml/h) **催吐リスク:最小 (<10%)** アバスチン 15mg/kg 初回投与・・・90分
 2回目投与・・・60分
 以降投与・・・30分 
- ④ 生食500ml+パクリタキセル _____ mg
 (100mg _____ V,30mg _____ V)
 点滴静注 (180min) ※インラインフィルター使用 **催吐リスク:軽度 (10~30%)** パクリタキセル 200mg/m² 
- ⑤ 生食250ml + カルボプラチン _____ mg (60min)
 (450mg _____ V,150mg _____ V,50mg _____ V) **催吐リスク:中等度 (30~90%)** カルボプラチン AUC=6 
- ⑥ ①の残液でフラッシュ
- ⑦ 生食20mlシリンジロック or ヘパリンシリンジロック(CVポートのみ)

1投2休

※印部分は各指示科での投与とする。

※ デカドロン 4mg 1日1回内服 day2-3